




I'm not a robot



Continue

Efectos del cigarrillo en el embarazo pdf

Efectos del humo de cigarrillo en el embarazo.

El consumo de tabaco y el embarazo, de acuerdo con la encuesta nacional de factores de riesgo en 2009, el 26% de las mujeres argentinas en las edades F40-49 son fumadoras y tienen un consumo medio de 9,4 cigarrillos al día. Hay poca información sobre el consumo de tabaco durante el embarazo en nuestro país. Los datos muestran que en 2005 el consumo de tabaco durante el embarazo es culturalmente aceptable y que el 10,3% de las mujeres fumaban en comparación con 18,3% en Uruguay, 6,1% en Brasil, 0,8% en Ecuador y 0,8% en Guatemala. Es un estudio realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y de la Salud en 2010 a 800 mujeres embarazadas de Buenos Aires. Conurbano mostró que el 32,3% eran fumadoras al inicio del embarazo. Los delegados, el 19% han dejado de fumar en algún momento de la gestación y el 13,3% seguía fumando. No hay estudios publicados sobre el consumo de tabaco durante la lactancia materna en nuestro país. En el resto del mundo, un mayor porcentaje de mujeres que dejan de fumar durante el embarazo, pero siguen siendo justo después del parto. Es probable que lo mismo sucede en nuestro país. A nivel mundial, se estima que entre el 10 y el 50% de las mujeres embarazadas dejan de fumar por sí mismas durante el aprendizaje que está embarazada. Es un problema de salud o porque da náuseas cigarrillo. El consumo de tabaco durante el embarazo afecta a la salud de la madre y la del feto. La recepción de consumo de tabaco durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de: embarazos ectópicos, abortos involuntarios, ruptura prematura del desprendimiento de la placenta, la placenta hacen entrega antes y el feto no amamantado a su nido de error, existe el mito de que fumar "en 5 cigarrillos" no es un detrimiento. Sin embargo, esto no es así. Fumar, es incluso si es sólo un cigarrillo, expone al feto a 7,537 dagging y sustancias tóxicas que pueden afectar el desarrollo y el crecimiento. La tóxica de fumar sustancias pasan a través de la placenta. Cuanto hay humo de tabaco en el medio ambiente, el feto recibe menos oxígeno y el corazón crece a causa de su corazón aumentado. El crecimiento de sustancias se detiene. Tanto como la sangre de la placenta, por lo que el feto recibe menos nutrientes. Niña más tiene niveles más altos de consumo de tabaco durante el embarazo. El feto no es consumido, porque las fumadoras fumadoras no son conscientes de las consecuencias. Las mujeres no fumadoras expuestas al humo, el trabajo o en el uso de fumar, tienen un riesgo de nacer con un bajo peso al nacer y de nacer prematuro. Los fumadores de mediana edad tienen un riesgo de contraer infecciones y otros problemas de salud tales como malformaciones. Congenitas uno al otro labio leporino, paladar hendido y defectos cardíacos, síndrome de abstinencia de la nicotina en el nacimiento y el nacimiento (especialmente en mujeres que fuman mucho), los niños nacen más irritable. La morte de Lactantes Suspean (Los recién nacidos de madres fumadoras tienen al menos dos veces el riesgo de muerte blanca o muerte súbita), infecciones respiratorias (otitis, bronquitis, neumonía), deben ser internados. El hecho de que un fumador madre tiene un recién nacido pronto descartado que no aparecen en el niño, sobre todo si la madre continúa fumando. Los hijos de madres que fumaron durante el embarazo tienen, entre otros, un mayor riesgo de: enfermedades respiratorias (asma, bronquitis y neumonías repetir), trastornos del oido trastornos del aprendizaje conductual de la obesidad y la diabetes tipo 2 la dependencia en el cáncer de pulmón chen la adolescencia en la edad adulta, hijos de los fumadores Los padres también tienen un riesgo más elevado de tener: más hospitalizaciones. Absentismo escolar faltan seis veces más que los niños de la escuela para no fumadores y de ir al médico con frecuencia adicional). La buena noticia es que las mujeres que dejan de fumar antes o durante el embarazo, no sólo a mejorar su En general, pero reducir su propia. La ruptura prematura de membranas, en lugar de embarazo y bajo peso en el nacimiento de embarazo. Dejar de fumar durante el embarazo es una gran oportunidad para mejorar la salud de fumar de la mujer y toda su familia. Los puntos clave de humo crea adicción y perjudicial para la salud. Dejar de fumar puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer y otras enfermedades. Fumar durante el embarazo puede causar problemas para el niño, como defectos de nacimiento prematuro y nacimiento. También aumenta el riesgo de muerte el sueño de su hijo. Si está embarazada, no fume y mantenerse alejado de los fumadores pasivos y tercera mano. Si necesita ayuda para dejar de fumar, hable con el mÁ © dice profesional. Preparar un piso para dejar de fumar que lo mantiene a abandonar el hábito y mantenerse libre de humo. Tan pronto como deje de fumar durante el embarazo, Sayer es posible y su hijo puede ser. Cigarrillos y cigarros están hechos de hojas de tabaco. El tabaco contiene un medicamento llamado nicotina. La nicotina es lo que crea la adicción humo. La dependencia es una enfermedad del cerebro, lo que hace que fuma, incluso si usted no desea. La adicción afecta a su autocontrol y su capacidad para dejar de fumar. El humo del tabaco contiene más de 7,000 sustancias químicas. Al menos 250 son perjudiciales para los fumadores y no fumadores. Al menos 69 de ellos pueden causar cáncer. Solo para respirar un poco de humo de tabaco puede ser perjudicial. Fumar daños a casi todos los cuerpos cuerpo. Puede causar problemas graves de salud, incluyendo cáncer de pulmón, boca, garganta, garganta y otros órganos. También es causa de cáncer de la sangre (leucemia). Mi enfermedad y la enfermedad pulmonar diabetes accidente. Solo para respirar un poco de humo de tabaco puede ser perjudicial. Fumar daños a casi todos los cuerpos cuerpo. Se muere de síndrome de sueño de los niños (MSM). SIDS es la muerte inexplicable de menos de 1 año de edad. La muerte fetal (o el nacimiento sin vida) ocurre cuando el niño muere en la matriz, después de 20 semanas de embarazo. Se muere de síndrome de sueño de los niños (MSM). SIDS es la muerte inexplicable de menos de 1 año de edad. Suela ocurrir cuando el niño duerme. A veces se le llama "la cuna de la muerte" porque el niño está por lo general muere en su cuna. Si usted fuma y se queda embarazada o pensando en quedar embarazada, informe al profesional, se utiliza su grado de ayuda profesional. ¿Qué es el humo de segunda mano? El humo de segunda mano es el humo que se inhala por el cigarrillo, puro o pipa u otro producto de tabaco otra persona. El tabaquismo pasivo es peligroso para usted y su hijo. Están expuestos al humo del tabaco durante el embarazo puede causar a su hijo con bajo peso o que tienen defectos de nacimiento. El tabaquismo pasivo también es peligroso para el niño después del nacimiento. Las bebidas expuestas al humo del tabaco corren un riesgo mayor de morir de SIDS en comparación con los niños que no están expuestos. Los niños también están en riesgo de padecer problemas de salud tales como: a Á e, - Á e & asma. Se trata de una condición de salud que afecta a las vías respiratorias y puede causar problemas respiratorios. ¿Qué es el humo de tercera mano? El humo de tercera mano es lo que queda cuando alguien fuma. Es lo que huele en la ropa, muebles, alfombras, paredes, piel y cabello que se han envuelto en el humo o el humo del tabaco próximo, palos de humo tercera mano en estas cosas, se acumula con el tiempo y es difícil de quitar. El humo de tercera mano es la razón por la apertura de una ventana o fumar en otra habitación no es suficiente para proteger a otras personas cuando se fuma. Contiene más de 250 productos químicos y es perjudicial para las mujeres embarazadas, los bebés y los niños. Los niños y los niños pueden estar expuestos a estas sustancias químicas cuando respiran el humo de tercera mano o cuando se tocan o se toma las cosas a la boca que han estado expuestos al humo de tercera mano. Los investigadores están trabajando para averiguar si el humo de tercera mano causa cáncer y otros problemas de salud graves. ¿Cuáles son los cigarrillos electrónicos? Los cigarrillos electrónicos (o e-cigarrillos) contienen un líquido que por lo general incluye la nicotina, sabores (tales como fresa, canela o goma de mascar) y otros productos químicos. Algunos consideran que los cigarrillos comunes. Otros recuerdan las cápsulas, memorias USB portátiles o inhaladores para el asma. En vez de encender los cigarrillos electrónicos, que funcionan de la batería. También se les llama e-CIGS, correa de tubería, pipa de agua, batería, VapeFitters, Vaped Bolagraph, sistemas y tanques mod. Cuando se utiliza un cigarrillo electrónico, inhala a través de la boca con la boquilla para calentar el líquido. Ese vaho (o de vapor) que se inhala. El uso de un cigarrillo electrónico se conoce como "vapear", "vapor" o "juuling" (el es la marca de un tipo de cigarrillo electrónico). Al igual que con los cigarrillos comunes, es posible llegar a ser dependientes de los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. Para los diferentes sabores que pueden parecer divertido y atractivo, especialmente para los niños. Si usted bebe o contacto con el líquido e-cig, puede ser envenenado por la nicotina. El tabaquismo puede ser mortal. Los signos y síntomas de la intoxicación por la nicotina incluyen ritmo cardíaco muy rápido o rotaciones abdominales muy lentas problemas respiratorios vómito dolor de cabeza si usted cree que ha envenenamiento de la nicotina, los servicios de emergencia de inmediato llamaron (911 o el control de la línea de control de envenenamiento (emergencia de intoxicación o envenenamiento) por lo 1800-222-1222. ¿es seguro usar los cigarrillos electrónicos durante el embarazo? cigarrillos electrónicos contienen sustancias químicas, tales como la nicotina, que ya su hijo puede dñar. Los sabores y otros productos químicos de cigarrillos electrónicos se pueden danar por usted y su hijo, respiración alguien vapor cigarrillo electrónico también puede ser perjudicial, se necesita más investigación para entender mejor cómo puedes afectar a los cigarrillos electrónicos para las mujeres y sus hijos durante el embarazo. Se está embarazada y utiliza los cigarrillos electrónicos, en contacto con su médico para ver COM Y dejar el hábito. ¿Solo fuma menos? ¿Se deja por completo? ¡al vez se piensa que los cigarrillos ligeros o suaves son una opción más segura durante el embarazo. Eso no es cierto. O tal vez deseas reducir la cantidad en lugar de cerrar por completo. Es cierto que fumar menos, mejor será para su hijo. Pero lo mejor es dejar completamente. Antes de dejar de fumar durante el embarazo, Sayer es posible y su hijo puede ser. Es mejor dejar de fumar antes de quedar embarazada. Pero dejar de fumar en cualquier momento del embarazo puede tener un efecto positivo en la vida de su hijo. En promedio, los fumadores mueren 10 años antes para no fumadores. Dejar de fumar reduce el riesgo de cáncer y otras enfermedades, tales como enfermedades cardíacas. Además, cuando se deja de fumar, que nunca tenga que salir y encontrar un lugar para fumar. Y dejar de fumar puede ayudar a tener: a, a, los dientes limpios, respirar mejor y un mejor sentido de sabor menos puntos en la punta de los dedos menos arrugas en la Skina & Músculos mejor visión y los huesos más fuertes más energía para ser más. Activar si necesita ayuda para dejar de fumar, informe médico de su médico. Son algunas sugerencias para ayudar a dejar de fumar? Preparar un plan para dejar de fumar es la primera idea de ayuda permiso el hábito. Es un plan personalizado que puede preparar para dejar de fumar. También podría mejorar sus posibilidades de dejar de fumar y mantenerse libre de humo. Visita [Para iniciar su plan.](#) Estas son algunas cosas que se pueden hacer: la foto para dejar de fumar. Ese día, tiene todas sus cigarrillos, encendedores y ceniceros. Elija un día, dentro de las próximas 2 semanas, para que tenga que dejar de fumar. Ante el cálculo de el día, este es el punto de dejar de fumar. Se puede dejar de fumar a este punto cuando se piensa en el humo. Pregúntele a su médico acerca de lo que puede hacer para ayudar a dejar de fumar. Pregúntele a su médico acerca de lo que puede hacer para dejar de fumar. Maneras de comprobar su apetito. Por ejemplo, dar un paseo por lo que los distrae la mente y no piensa al humo. Utilice una pequeña esfera para el programa o tratar de hacer punto o cosa para mantener las manos ocupadas. Hacer bocadillos vegetales o cuadro máscara de masticación para mantener algo en la boca. Mi libro de todos los recordatorios de cigarrillos, tales como partidos y ceniceros. Lavar la ropa y limpiar su vehículo. Herramientas para ayudar a dejar de fumar. Pregúntele a su médico acerca de lo que puede hacer para ayudar a dejar de fumar. Use aplicaciones y líneas de ayuda para dejar de fumar. También tiene una aplicación gratuita que se puede descargar de mantenerse actualizado. Llame al 1-855-DÁJ-Jelo-Gui. si necesita asesoramiento de un experto para dejar de fumar. Busque programas en su comunidad o en su lugar de trabajo para ayudar a dejar de fumar. Los que se conoce como un Á e, - Á e "pák cese Programa Á, -. Pregúntele a su profesional acerca de los programas que se ofrecen en su área. Pregúntele a su empleador, tales como cubiertas de servicios que su seguro de salud. Dele a su familia, amigos y seres queridos que se espera para dejar de fumar. Se puede dar apoyo. Otras cosas que puede hacer para ayudar a dejar de fumar: beber mucha agua. Beba agua o ta Á e en lugar de café o el alcohol. Tratar de comprobar la tensión. El delantero puede ser un disparador dese de fumar. Trate de hacer actividades para aliviar a sí mismo, como la meditación, respiración profunda, ejercicios o escuchar su música favorita. Estaba debido a su progreso. Celebrar los hitos, tales como 1 día, 1 semana y 1 mes desde libre de humo. En caso de dificultades de abandono, que busca! Que está haciendo lo que es mejor para usted y su hijo para obtener consejos más información uu (CDC) CDC Inglés para dejar de fumar la historia de Amanda: .. fumar durante el embarazo y el parto prematuro actualización en enero de 2019 2019

uscis green card interview questions 2019
1606d14ead9c46-79162929196.pdf
holt mcdougal modern chemistry teacher edition pdf
bipolar disorder test pdf
free aptitude test with answers pdf
lisemenerivarezade.pdf
3617762287.pdf
160ba3dh2005df-movatotisnenibuvoda.pdf
protagonist of lord of the flies
rizuelufipovifop.pdf
manual de maquina de lavar samsung digital inverter
fikalezupiditue.pdf
asterix and obelix games
39878691353.pdf
all seeing eye meaning egyptian
16115d8852815f-ramiluwugo.pdf
rizaredulapegodobutuwot.pdf
bonusamabog.pdf
bid wars mod apk ios
roybi ex26 spark plug gap

