Continue

nhs pdf إرشادات قصور الغدة الكظرية

[illegible] انخفاض حاد في ضغط الدم. انخفاض مستويات سكر الدم. ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم. زيادة احتمالية

ساعد هذه الغدوصات على معرفة مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكورتيزول في الدم. إضافة إلى مستويات الهرمون الموجه للغدة الكظرية. 1. القصور الكظري الأولي يحدث هذا النوع من القصور عندما لا تنتج القشرة الكظرية كميات كافية من الهرمونات، ويعود ذلك في معظم الأحيان إلى أمراض المناعة الذاتية، حيث يتعرف جهاز المناعة على قشرة الغدة الكظرية على أنها أجسام غريبة فيهاجمها ويدمرها. 2. قصور الغدة الكظرية الثانوي في هذا النوع يكون عجز الغدة الكظرية عن إفراز هرمون الكورتيزول في الدم، إن السبب الأكثر شيوعًا هو استخدام الأدوية التي تسمى الكورتيكوستيروئيدات لفترة طويلة وبجرعات عالية. تساعد الكورتيكوستيروئيدات في علاج العديد من الحالات المرضية، بما في ذلك الربو والتهاب المفاصل الرثياني والذئبة الحمامية. يمكن أن تتسبب بجعجعة [illegible] الهيدروكورتيزون